

# 《產兒科護理學》

- D 1 有關「母嬰親善醫院」認證評鑑的標準，下列何者正確？  
 (A)每次哺餵後可餵新生兒少許開水，以免奶水殘留口中導致感染  
 (B)新生兒若飢餓哭泣會吃入空氣影響母乳哺餵量，應給予奶嘴防止哭泣  
 (C)鼓勵母親哺餵母乳，白天每 2~3 小時哺餵，夜間每 3~4 小時哺餵  
 (D)懷孕時便應知道哺餵母乳的好處，產後安排母嬰立即接觸
- C 2 具有伸展會陰部肌肉功用的產前運動項目，下列何者最相關？  
 (A)扭轉骨盆運動 (B)大腿伸展運動 (C)蹲踞運動 (D)抬腿運動
- C 3 孕婦對懷孕產生負向感覺，並隨著妊娠進展會擔心胎兒是否斷手斷腳或是有缺陷，此為那一孕期最常見的心理反應？  
 (A)第一妊娠期 (B)第二妊娠期 (C)第三妊娠期 (D)第四妊娠期
- B 4 羊膜穿刺術理想檢測時間為懷孕 16~18 週，下列何者不是考量此時間點檢測的主要原因？  
 (A)此時期足夠羊水量，約 200 mL (B)此時  $\alpha$  胎兒蛋白 (AFP) 分泌濃度最高  
 (C)子宮已上升至恥骨聯合之上，易操作 (D)羊水中存活細胞比率最大，易培養
- C 5 有關胎兒發育之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)懷孕第 4 週開始有心跳 (B)懷孕第 8 週所有器官都形成  
 (C)懷孕第 16 週眼睛可感受到外界光線 (D)懷孕第 20 週有規律的睡眠和活動
- A 6 一位第三孕期婦女，飲食為蛋奶素，有關孕期飲食指導，下列何者錯誤？  
 (A)需額外增加維生素 E 攝取，促進紅血球發育  
 (B)應攝取多醣類食物，避免吃單醣類  
 (C)此孕期仍應補充葉酸，故應多吃深綠色蔬菜  
 (D)比第二孕期鐵劑補充量增加二倍，以助嬰兒出生後使用
- B 7 懷孕 35 週婦女，走路時感到鼠蹊部痛，主要是那一條子宮韌帶受影響？  
 (A)闊韌帶 (B)圓韌帶 (C)主韌帶 (D)子宮骶骨韌帶
- D 8 懷孕 28 週婦女，羊水指數 (AFI) 小於 5 公分，表示胎兒可能出現下列何種情況？  
 (A)水腦 (B)胎兒過重 (C)食道閉鎖 (D)子宮內生長遲滯
- B 9 王女士懷孕 38 週，胎位為左枕前位 (LOA)，胎心音的測量最合宜的部位為？  
 (A)右側臍棘線中點 (B)左側臍棘線中點  
 (C)肚臍與恥骨連合線上中點 (D)腸骨兩側
- C 10 有關生產疼痛理論，下列描述何者正確？  
 (A)待產時腹部輕撫按摩法是利用條件反射理論  
 (B)Read 醫師提出害怕、緊張與疼痛條件反射理論  
 (C)呼吸放鬆技巧利用條件反射理論來減輕分娩時的疼痛  
 (D)待產時集中注意力與意象法是利用條件反射理論
- D 11 待產婦女陰道檢查結果為 station +1，表示先露部位位於何處？  
 (A)坐骨棘連線上 1 公分 (B)會陰部下 1 公分  
 (C)會陰部上 1 公分 (D)坐骨棘連線下 1 公分
- D 12 第二產程胎頭娩出時，為了減少會陰部撕裂傷，下列措施何者較不適當？  
 (A)請產婦哈氣 (B)請產婦採喘息呼吸 (C)讓產婦採側躺 (D)將產婦臀部墊高
- D 13 下列何者是產婦待產時的危險徵象？  
 (A)子宮頸口擴張至 4 公分破水 (B)現血增加  
 (C)臍繞頸一圈 (D)羊水中含有胎便

- C 14 李女士每 1 分鐘子宮收縮一次，每次持續 50 秒，子宮頸口全開，變薄程度 100%，胎兒先露部位高度為 +2，有強烈想用力的感覺。當子宮收縮時，下列的護理指導何者最恰當？  
 (A)告知不要喊叫 (B)採持續長時間閉氣用力法  
 (C)打開聲門用力法 (D)腹式呼吸
- A 15 有關待產時胎心音之監測，下列敘述何者錯誤？  
 (A)持續性胎心音監測可大幅降低新生兒周產期死亡率  
 (B)持續性胎心音監測可能增加剖腹產率  
 (C)低危險妊娠建議採間歇性的胎心音監測  
 (D)高危險妊娠第一產程應每 15 分鐘記錄胎心音一次
- B 16 李女士，子宮頸口開 4 公分，擬採腰椎硬脊膜外阻斷麻醉。護理師先行給予林格氏液 Lactated Ringer' s solution 500 c.c.，其維持靜脈輸液的主要目的是：  
 (A)減輕噁心嘔吐 (B)預防血壓過低 (C)減輕頭痛現象 (D)加速產程進展
- A 17 承上題，第二產程用力時，胎心率出現早發性減速的原因為何？  
 (A)胎頭受壓 (B)胎兒缺氧 (C)臍帶受壓 (D)子宮缺氧
- D 18 有關 WHO 的成功母乳哺育十措施中母嬰肌膚接觸之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)母嬰肌膚接觸時應監測新生兒血氧濃度或膚色情況  
 (B)鼓勵母嬰肌膚接觸時間至少 1 小時  
 (C)當出現尋乳徵象時，可嘗試第一次餵奶  
 (D)剖腹產後不應進行母嬰肌膚接觸
- A 19 林女士 G2P2，採陰道分娩，產後第 1 天，觸診子宮偏軟，位置與肚臍同高並偏向右側，此時優先的護理評估項目為何？  
 (A)解尿情形 (B)大便次數 (C)進食狀況 (D)會陰傷口
- D 20 有關待產的麻醉藥物減痛之敘述，下列何者正確？  
 (A)目前剖腹產常使用全身麻醉方式  
 (B)腰椎硬膜外麻醉法施用於子宮頸口擴張 2 公分時  
 (C)腰椎硬膜外麻醉法需要注意呼吸抑制及高血壓現象  
 (D)腰椎硬膜外麻醉法針頭刺入部位為 L3-4
- A 21 產後 6~10 天心跳次數較孕前減緩，最可能的原因為何？  
 (A)心輸出量增加 (B)心臟負荷增加 (C)產後出血 (D)腹壓增加
- D 22 有關哺餵母乳婦女產後排卵與月經之生理變化，下列敘述何者正確？  
 (A)泌乳素抑制濾泡刺激素而抑制排卵 (B)哺餵母乳婦女子宮復舊時，月經也差不多恢復  
 (C)月經延後發生，表示排卵也延後 (D)純哺餵母乳會延後排卵
- D 23 有關產後泌尿系統的變化，下列敘述何者錯誤？  
 (A)會陰傷口或裂傷使產婦對膀胱漲滿的敏感度減低  
 (B)產後 12~24 小時會藉利尿作用將孕期積聚過多的液體排出  
 (C)產後 2~3 天尿量可高達一天 3,000 c.c.  
 (D)產後第 10 天尿量開始恢復正常
- B 24 胎盤娩出後，腦下垂體前葉分泌何者使乳房開始分泌乳汁？  
 (A)催產素 (B)泌乳素 (C)動情素 (D)黃體素
- C 25 有關 RU486 (mifepristone) 的臨床治療，下列何者錯誤？  
 (A)是黃體素的拮抗劑，須由醫師開立處方簽 (B)在懷孕 6 週前服用，成功率最高  
 (C)可帶藥物回家服用，須於 1~2 週內回診檢查 (D)與前列腺素合併使用，成功率可達 95%
- D 26 Apgar score 計分表的評估項目不包含下列那一項？  
 (A)心跳速率 (B)肌肉張力 (C)皮膚顏色 (D)血氧濃度

- C 27 糖尿病孕婦所產下體重過重的嬰兒（出生體重在 4,000 公克以上）容易在出生後發生低血糖的狀況，主要原因可能是：
- (A) 新生兒出生後無法釋放足夠的胰島素，葡萄糖調節失控所致
  - (B) 新生兒出生後仍保留從母親獲得的大量葡萄糖，胰島素迅速分泌增加所致
  - (C) 母親供應的葡萄糖出生後中斷，新生兒體內存在過多的胰島素快速消耗葡萄糖所致
  - (D) 新生兒剛出生，還沒有開始進食大量奶水，體內葡萄糖容量不足所致
- B 28 下列何者為新生兒黃疸照光治療的原理？
- (A) 能讓未結合型膽紅素因光之熱能而加速排出體外
  - (B) 能將未結合型膽紅素異構化使其容易排出體外
  - (C) 能將未結合型膽紅素在肝臟中解體後排出體外
  - (D) 能加速肝臟合成尿苷酸轉化酶與未結合型膽紅素結合
- B 29 剛出生的女嬰出現假性月經與母親那一個荷爾蒙中斷有關？
- (A) 黃體素 (B) 雌性素 (C) 胰島素 (D) 醛固酮
- B 30 有關新生兒毒性紅斑與膿疱之敘述，下列何者正確？
- (A) 毒性紅斑需要注意與治療 (B) 毒性紅斑通常在出生後最初的 4 天內發生
  - (C) 膿疱不具傳染性，可能很快就消失 (D) 膿疱通常是感染大腸桿菌所造成
- D 31 張女士目前子宮頸口開 6 公分，每 10 分鐘宮縮 2 次，每次持續 20 秒，宮縮壓力 10 mmHg，產程已持續 3 小時無進展。張女士顯得疲累，胎心音正常，下列臨床處置何者正確？
- (A) 準備剖腹產 (B) 給予止痛藥
  - (C) 輸注 Ritodrine (Yutopar) (D) 輸注催產素
- D 32 孕婦早期破水的評估與處置，下列何者錯誤？
- (A) 觀察陰道分泌物的顏色及味道
  - (B) 監測白血球及 C 反應蛋白的變化
  - (C) 盡量減少陰道內診次數，以降低感染機會
  - (D) 確認懷孕 34~36 週者胎兒的成熟度，如已成熟即可剖腹產
- B 33 丁女士在產後 10 天惡露量突然變多且呈紅色，到門診產後檢查後確立為子宮復舊不全，造成子宮復舊不全的主要原因為何？
- (A) 胎膜殘留 (B) 胎盤碎片殘留 (C) 子宮張力不全 (D) 骨盆感染
- D 34 有關產褥感染，下列何者正確？①其定義是產後任 2 天體溫在 38°C 或 38°C 以上 ②最常見的細菌為陰道內的細菌，例如 B 群鏈球菌 ③以腸胃道感染最常見 ④每天至少需 2,500~3,000 毫升的水分攝入
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ②④
- B 35 有關萎縮性陰道炎之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 常見於更年期後或卵巢切除婦女 (B) 因黃體素缺乏使陰道黏膜萎縮、上皮變薄
  - (C) 陰道酸鹼度增高有利於其他菌種生長 (D) 主要症狀為陰道分泌物、外陰搔癢與刺痛
- A 36 有關不孕症夫妻性生活的護理指導，下列敘述何者錯誤？
- (A) 排卵期前後每天行房以提高受孕機會 (B) 性交後墊枕頭抬高女性之臀部
  - (C) 鼓勵夫妻互相溝通彼此的感受與需要 (D) 排卵期黏液會由黏稠變稀薄、由少量變多量
- A 37 有關陰道感染的護理措施，下列何者正確？
- (A) 念珠菌陰道炎治療需停用口服避孕藥、抗生素與類固醇
  - (B) 滴蟲陰道炎治療期間完全禁止性行為
  - (C) 披衣菌陰道炎患者的性伴侶不需特別治療
  - (D) 依醫囑給予披衣菌陰道炎患者 Gentamycin 抗生素治療
- D 38 有關子宮內膜癌之敘述，下列何者正確？

- (A)長期使用黃體素是危險因子之一 (B)常見的症狀表現是下腹疼痛  
(C)治療方式以化學治療為主 (D)晚停經的婦女較易發生
- D 39 有關子宮頸抹片檢查之敘述，下列何者正確？  
(A)全民健保提供 35 歲以上婦女 1 年一次免費檢查  
(B)不論有無性經驗的婦女，每 3 年至少接受一次子宮頸抹片檢查  
(C)檢查前需先沖洗陰道，以避免分泌物過多，影響結果  
(D)是目前預防子宮頸癌最好方式
- D 40 有關更年期的賀爾蒙變化，下列何者正確？  
(A)濾泡激素 (FSH) 下降；黃體生成素 (LH) 下降  
(B)濾泡激素 (FSH) 下降；黃體生成素 (LH) 上升  
(C)濾泡激素 (FSH) 上升；黃體生成素 (LH) 下降  
(D)濾泡激素 (FSH) 上升；黃體生成素 (LH) 上升
- C 41 下列何種中毒情況適合為兒童進行催吐？  
(A)小於 6 個月嬰兒口服藥物中毒 (B) 3 歲幼兒誤食杜鵑花葉導致昏迷  
(C) 4 歲兒童誤食有毒磨菇 (D) 5 歲兒童誤食廚房清潔劑
- D 42 依據丹佛 II 嬰幼兒發展篩檢測驗 (DDST-II) 評估來健兒門診的王小妹，她能自己扣鈕釦、用手指夾葡萄乾、單腳站立 5 秒鐘，王小妹大約是幾歲？  
(A) 1~1.5 歲 (B) 2~2.5 歲 (C) 3~3.5 歲 (D) 4~4.5 歲
- B 43 根據羅文費 (Viktor Lowenfeld) 的兒童繪畫發展階段論，一般兒童從幾歲開始對塗鴉的點、線、圈等加上意義或命名？  
(A) 2~2.5 歲 (B) 3~3.5 歲 (C) 5~5.5 歲 (D) 6~6.5 歲
- A 44 有關護理師在醫院中運用治療性遊戲 (Therapeutic play) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)透過遊戲以了解兒童內心想法，以治療其心理或行為疾病  
(B)作為溝通橋樑，可以協助了解兒童住院行為反應  
(C)具有指導性質，可協助兒童認識自己的身體或疾病  
(D)藉由角色扮演的遊戲，可同時達到學習及情緒表達的功能
- 45 李小妹，8 歲，因敗血病住進加護病房，很在意父母親是否準時到病房探視，不斷詢問護理師探病時間。李小妹的行為屬於下列何種情況？  
(A)學習認識時間概念 (B)自我中心 (C)分離焦慮 (D)在意身體心像
- C 46 下列何者不是瀕死兒童的生理變化？  
(A)出現陳施氏呼吸型態 (B)感覺很熱，身體卻很冰冷  
(C)視力模糊，眼睛分泌物增加 (D)聽覺減少，對疼痛的刺激敏感
- D 47 下列何者不是腮腺炎的臨床典型症狀？  
(A)發燒 (B)食慾不振 (C)耳朵痛 (D)皮疹
- D 48 有關兒童氣喘 (Asthma) 的敘述，下列何者正確？  
(A)臺灣常見的過敏原是海鮮 (B)發作時呼吸道平滑肌舒張  
(C)與遺傳體質、環境無關 (D) IgE 免疫球蛋白會增加
- B 49 林小弟，13 歲，學校體檢時發現上肢血壓高，鼠蹊脈搏較上肢脈搏微弱，主訴頭痛，常常感覺腳部冰冷，林小弟可能罹患下列何種疾病？  
(A)心室中隔缺損 (B)主動脈狹窄 (C)肺動脈瓣狹窄 (D)大血管轉位
- B 50 有關兒童白血病的敘述，下列何者正確？  
(A)兒童最常發生的是慢性骨髓性白血病 (B)急性淋巴球性白血病好發於 2~6 歲兒童  
(C)發病年齡與白血病的預後無關 (D)兒童白血病的確診檢查為腰椎穿刺
- D 51 下列何者是幼兒泌尿道感染常見的致病菌？

- (A)變形桿菌屬 (Proteus spp.) (B)腸球菌 (Enterococcus)  
 (C)克雷白氏桿菌屬 (Klebsiella spp.) (D)大腸桿菌 (E. coli)
- C 52 丁丁，2 歲，診斷為水腦，並接受腦室－腹膜分流術 (V-P shunt)，現已術後第 5 天，今早丁丁哭鬧不喝奶，測得體溫達 38.2°C、血壓為 100/60 mmHg，有關護理評估，下列何者需優先執行？  
 (A)疼痛評估 (B)意識評估 (C)感染評估 (D)營養評估
- D 53 小明，3 歲，被機車撞倒，頭部受傷，有關腦壓增高的早期臨床表徵，不包括下列何者？  
 (A)痙攣、頭痛 (B)斜眼、複視 (C)噴射狀嘔吐 (D)瞳孔大小不對稱
- B 54 協助病童接受腰椎穿刺檢查過程中，下列護理措施何者不恰當？  
 (A)穿刺前應仔細評估病童有無顱內壓升高之徵象  
 (B)穿刺時協助病童採半側臥、頭高腳低的舒適臥位  
 (C)穿刺前後應監測病童是否有脊髓脫出的症狀產生  
 (D)穿刺後教導病童平躺以減少頭痛及穿刺部位出血
- C 55 小美，3 歲，因重積癲癇而入住加護病房照護，下列何者不是以家庭為中心的照護？  
 (A)評估小美個別需求，提供父母彈性的探訪時間  
 (B)在父母有意願的情況下，讓其參與小美侵入性治療及檢查過程  
 (C)由於治療的複雜性，應避免父母參與治療計畫與決策  
 (D)專業醫護人員隨時跟小美的父母分享資訊，包含相關的科學新知
- B 56 小銘，2 歲，罹患典型的異戊酸血症 (Isovaleric Acidemia)，下列敘述何者正確？  
 (A)小銘的疾病是一種有機酸代謝異常的體染色體顯性遺傳疾病  
 (B)大量的異戊酸堆積在體內，小銘的尿液會有明顯的臭腳汗味  
 (C)小銘急性發作時主要的醫療處置是矯正脫水及呼吸性鹼中毒  
 (D)小銘可以攝取特殊配方奶，並逐漸增加肉鹼 (carnitine) 攝取量
- D 57 小春，國中 3 年級，1 年前被診斷罹患青少年憂鬱症，曾服用 fluoxetine 及 ativan 治療。最近因會考在即，課業壓力導致失眠，情緒常常不穩定，今在家忽然情緒失控，故至醫院求治，醫師表示可能憂鬱症再發，需再服藥治療。母親詢問護理師應該要怎麼做對小春最好，下列回答何者為佳？  
 (A)多給予小春獨處的空間，及提供獨立思考的時間  
 (B)如果服藥後有嗜睡的副作用則可先停藥，避免影響功課  
 (C)可幫小春請家教或上補習班，幫助小春成績進步以減少壓力  
 (D)可多陪伴小春，鼓勵到戶外曬太陽與進行規律運動
- D 58 有關兒童罹患自閉症會出現的身心表徵，下列何者錯誤？  
 (A)出現不理人，不看人等，對人缺乏反應的現象  
 (B)出現鸚鵡式仿說或答非所問  
 (C)遊戲玩法單調缺變化，出門走一定路線  
 (D)身體及眼球經常出現不自主擺動
- B 59 小英，5 個月，採心尖脈測量心跳，有關心尖脈位置之敘述，下列何者正確？  
 (A)左鎖骨中線與第一、二肋骨的交會處 (B)左鎖骨中線與第三、四肋骨的交會處  
 (C)左鎖骨中線與第五、六肋骨的交會處 (D)左鎖骨中線與第七、八肋骨的交會處
- B 60 有關兒童住院壓力，下列敘述何者錯誤？  
 (A)嬰兒住院，最主要的壓力源是與父母分離  
 (B)幼兒會以合理化方式，來因應其住院帶來的限制  
 (C)學齡前期兒童常誤解其住院原因，而出現罪惡感  
 (D)學齡期兒童可以理解生病的原因是來自外在的

- C 61 護理師為 6 個月大嬰兒進行肌肉注射，下列處理方式何者最適當？  
(A)告訴他可以哭，不可以亂動 (B)請母親暫時離開注射環境  
(C)盡速完成治療過程，減少疼痛刺激的時間 (D)用鼓勵的方式，答應注射後給予獎勵
- B 62 小群目前 3 個月大，因膽道閉鎖未治療造成肝臟硬化、脾腫大、肝昏迷，有關提供小群的家屬家庭支持，下列敘述何者不適當？  
(A)與小群的家屬溝通時，將會談的焦點放在他們關心的事情上  
(B)主動多次提及並討論未能於小群出生時及早發現膽道閉鎖的原由  
(C)陪伴並鼓勵表達所承受的痛苦，以同理心傾聽家屬的焦慮  
(D)言談中流露對小群的真誠關懷，且願意提供訊息與資源
- D 63 新生兒曾暴露於巨細胞病毒、德國麻疹等感染源中，下列那一種抗體濃度會升高？  
(A)  $\gamma$  球蛋白 (B) IgG (C) IgA (D) IgM
- B 64 小明，2 個月大，罹患後天免疫缺乏症候群，有關預防接種的敘述，下列何者錯誤？  
(A)小兒麻痺疫苗建議不可口服沙賓疫苗 (B)終生不可接種 b 型流行性感胃嗜血桿菌疫苗  
(C)B 型肝炎、肺炎雙球菌疫苗均可按時接種 (D)免疫功能低下，則不予接種水痘疫苗
- D 65 臺灣安寧緩和醫療條例保障不可治癒之臨終末期病人的醫療意願，有關兒童安寧緩和醫療照護，下列敘述何者錯誤？  
(A)家屬簽署“不施行心肺復甦術同意書”前，建議能夠和病童充分溝通  
(B)依照病童的年齡可利用繪本故事共同討論他們對死亡的概念  
(C)父母在病童臨終時，依照病童體力可負荷狀況盡力滿足病童的心願  
(D)兒童安寧緩和醫療不宜於兒童癌症診斷確立時即介入
- A 66 小瑋，6 歲，罹患膽道閉鎖，多年來等不到肝臟移植，面臨死亡，父母在與小瑋討論死亡時，下列敘述何者錯誤？  
(A)僅提及快樂的事情，避免引發哀傷反應，以減輕小瑋焦慮  
(B)小瑋主動提及死亡時，父母應認真回應，不要虛張聲勢  
(C)問問小瑋：「你的想法呢？」，使小瑋有機會說自己對死亡的想法  
(D)父母與小瑋主動分享自己面對死亡的感受
- A 67 有關兒童疼痛之敘述，下列何者錯誤？  
(A)3~5 歲的兒童尚無法以語言表達出疼痛的程度  
(B)護理師可經由觀察或各種疼痛量表來評估兒童疼痛情形  
(C)新生兒會以全身身體活動來反應其疼痛  
(D)兒童疼痛的處理，經評估後，可依照醫囑給予止痛藥物
- D 68 有關 4 歲兒童使用集尿袋收集常規尿液標本，下列敘述何者正確？  
(A)需以優碘藥水消毒兒童會陰處  
(B)需遵守無菌技術操作原則收集尿液  
(C)女童先黏貼恥骨聯合處，再向下黏至肛門肌肉  
(D)男童盡可能將陰莖與陰囊放入集尿袋
- B 69 王小妹，1 歲，因感冒、發燒、左耳痛而就診，被診斷為急性中耳炎，下列護理措施何者較適當？  
(A)避免藥物成癮，衛教少服止痛藥  
(B)清潔耳道時，耳朵宜向下向後拉  
(C)休息時宜採側右臥姿，以免壓迫左耳  
(D)避免產生抗藥性，衛教若無症狀，其抗生素即可自行停藥
- B 70 張小弟，5 個月大，因呼吸喘、痰液多而入院，診斷為細支氣管炎 (Bronchiolitis)，入院後需抽痰，有關抽痰護理的敘述下列何者正確？

- (A)抽痰順序宜先由口腔開始，再到鼻腔  
 (B)抽痰前後宜給予適當的氧氣吸入，以避免缺氧情形  
 (C)抽吸時間最好維持在 12~15 秒之間，以預防缺氧情形  
 (D)抽吸壓力維持在 110~130 mmHg
- A 71 正常情況下，兒童心臟血管的含氧量下列何處最高？  
 (A)肺靜脈 (B)肺動脈 (C)上腔靜脈 (D)右心房
- A 72 王小妹，5 歲，罹患心房中隔缺損，進行心導管檢查。有關心導管檢查後的護理措施，下列敘述何者正確？  
 (A)右心導管檢查後需臥床 4~6 小時  
 (B)穿刺肢體保持彎曲，有利止血  
 (C)檢查後應持續禁食 6 小時，再開始嘗試液體食物  
 (D)返家後應至少 3 天不要洗澡，避免感染
- C 73 罹患開放性動脈導管的病童，較不會出現下列何種症狀？  
 (A)心搏過快 (B)肺動脈高壓 (C)紅血球增多症 (D)餵食困難
- A 74 下列何者血液疾病不屬於體染色體隱性遺傳？  
 (A) A 型血友病 (hemophilia) (B)范康尼氏症候群 (Fanconi's syndrome)  
 (C)鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia) (D)  $\beta$ -海洋性貧血 ( $\beta$ -thalassemia)
- B 75 有關威廉氏腫瘤 (Wilms tumor) 之可能出現的臨床表徵，下列何者錯誤？  
 (A)疼痛 (B)低血壓 (C)貧血 (D)疲倦
- C 76 小珍，8 歲，第 1 型糖尿病病童。幾天來出現噁心、嘔吐、易口渴症狀，現因呼吸、心跳快且深而到急診。Blood sugar 780 mg/dL、K<sup>+</sup> : 5.0 mEq/L、Na<sup>+</sup> : 138 mEq/L、Urine sugar 3+、ketone+。  
 由上述症狀評估小珍可能出現的問題為：  
 (A)高滲透壓高血糖狀態 (B)低滲透壓高血糖狀態  
 (C)糖尿病酮酸症 (D)低血糖性休克反應
- D 77 王小妹，7 歲，被診斷泌尿道感染 (Urinary Tract Infection)，出院時醫囑開立 7 天份的口服抗生素 amoxicilline，下列護理指導何者適當？  
 (A)解尿無疼痛或無灼熱感，即可停藥 (B)尿量增加，尿液清澈，即可停藥  
 (C)藥物吃完，完成治療，即可避免復發 (D)藥物吃完，需回診追蹤及檢查尿液
- A 78 有關隱睪症 (cryptorchidism)，下列敘述何者錯誤？  
 (A)胎兒 7 個月時睪丸應已進入陰囊 (B)早產兒發生隱睪症的機率高於足月兒  
 (C)出生後一年內未下降的睪丸可能會自動下降 (D)臨床醫療處置以手術或荷爾蒙治療為主
- B 79 有關先天性巨結腸症 (congenital megacolon) 之臨床表徵，下列敘述何者錯誤？  
 (A)新生兒胎便延遲排出 (B)嘔吐物不含膽汁  
 (C)嬰幼兒慢性便秘 (D)嬰幼兒生長遲滯
- B 80 有關腦性麻痺 (cerebral palsy) 的敘述，下列何者正確？  
 (A)由濾過性病毒經由口或飛沫傳染，侵犯脊髓灰白質  
 (B)治療目標在增進運動功能和預防殘障加重  
 (C)吞嚥困難時，協助頭部維持正中位置，將食物放在舌頭前方，以利吞嚥  
 (D)病童主要問題為肢體障礙，大部分兒童的智能是屬於正常的