

《內外科護理學》

- A 1 有關脊髓休克 (Spinal shock) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A)病人的肛門反射正常 (B)受傷部位以下的肌肉力量消失
 (C)受傷部位以下的溫、痛、觸覺消失(D)腸蠕動下降或出現麻痺性腸阻塞
- B 2 右側大腦損傷所引起的功能缺失，下列何者正確？①左側偏癱 ②空間及認知缺損 ③語言及計算能力降低 ④行動變得快及衝動
 (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④(D)②③④
- A 3 有關暫時性缺血發作 (transient ischemic attack; TIA) 使用藥物治療，下列何者正確？
 (A)抗血小板凝集藥物，如：aspirin(B)降低腦壓藥物，如：mannitol
 (C)腦血管擴張劑，如：papaverine(D)預防血管痙攣劑，如：nimodipine
- C 4 關於多發性硬化症的敘述，下列何者正確？①為中樞神經系統髓鞘脫失而影響神經傳導 ②吞嚥困難為早期出現臨床表徵 ③腦脊髓液檢查發現 IgG 抗體增加 ④感染會引發疾病惡化
 (A)①②③(B)①②④(C)①③④(D)②③④
- D 5 指導重症肌無力病人之護理措施，下列何者錯誤？
 (A)避免過度勞累，以防誘發肌無力(B)應坐直立吃東西，下巴朝向胸部再行吞嚥動作
 (C)應於服用抗膽鹼酯酶藥物之後再運動(D)出現腹部痙攣疼痛時，可能為藥物劑量不足徵象
- C 6 75 歲老人最近心情抑鬱，對外在環境興趣缺缺，腦部電腦斷層顯示腦組織萎縮、腦溝變大，下列何者為其最可能診斷？
 (A)憂鬱症(B)譫妄症(C)阿茲海默氏症(D)巴金森氏症
- B 7 有關脊髓損傷造成弛緩型神經性膀胱的排尿訓練，下列何者正確？
 (A)定時敲擊恥骨上方，以刺激排尿反射(B)使用副交感神經刺激劑，以利膀胱迫尿肌收縮
 (C)練習會陰肌肉收縮運動(D)尿管留置或尿布使用，以解決滲尿問題
- D 8 有關闌尾炎護理措施的敘述，下列何者正確？
 (A)右下腹部可熱敷(B)手術前須先灌腸
 (C)術後鼓勵病人盡量床上休息(D)術後 6 週內避免提重物
- C 9 有關肛門瘻管手術治療後常見的併發症，下列何者正確？①出血 ②腹股溝疝氣 ③瘻管復發④解便失禁
 (A)①②③(B)①②④(C)①③④(D)②③④
- C 10 有關大腸癌病因的敘述，下列何者錯誤？
 (A)大腸息肉 (B)發炎性腸病變
 (C)飲食習慣攝取富含植物性蛋白食物(D)飲食習慣缺乏高纖維食物與蔬菜
- D 11 腸道檢查前一日，可以攝取之飲食，下列何者較適當？
 (A)溫和飲食(B)限鈉飲食(C)半流質飲食(D)清流質飲食
- C 12 有關黃疸之敘述，下列何者正確？
 (A)溶血性黃疸是肝硬化所致(B)肝細胞性黃疸之白血球數增多
 (C)阻塞性黃疸之凝血酶原時間延長(D)上述三種黃疸尿膽紅素皆增加
- D 13 有關風濕熱之敘述，下列何者正確？①最常侵犯三尖瓣 ②須使用抗生素治療 ③應多從事體能活動以強化心臟功能 ④若有心衰竭症狀須採低鹽飲食
 (A)①③(B)①④(C)②③(D)②④
- B 14 有關腦脊髓液的檢查，下列何者異常？
 (A)外觀清澈(B)葡萄糖的值為血糖值的 20~30 %
 (C)蛋白質為 15~45 mg/dL(D)側躺時壓力為 70~180 mmH₂O

- D 15 肝穿刺切片檢查時，為避免橫膈穿孔與肝臟撕裂傷，教導病人當針頭插入肝臟時應採取的動作，下列何者正確？
 (A)用力深呼吸(B)張開嘴巴說「啊」
 (C)數個深呼吸後，深吸氣並摒住呼吸(D)數個深呼吸後，深吐氣並摒住呼吸
- B 16 有關胃食道逆流病人之護理指導，下列何者錯誤？
 (A)應少量多餐(B)睡覺前吃一點宵夜(C)睡覺時床頭抬高(D)避免便秘
- B 17 有關退化性關節炎的敘述，下列何者正確？
 (A)常合併乾燥症(B)不會影響身體的其他系統
 (C)出現血管炎，如腳趾壞死或小腿潰瘍(D)出現倦怠、發燒、貧血
- B 18 有關脂肪栓塞症之症狀和徵象，下列何者正確？①呼吸急促 ②意識混亂 ③排尿增加 ④體溫上升
 (A)①②③(B)①②④(C)①③④(D)②③④
- B 19 王先生，55 歲，身體質量指數為 30 kg/m²，紅血球沉降速率正常範圍，主訴早晨起來關節疼痛與僵硬，在活動幾分鐘後可緩解僵硬。下列何者為王先生最可能的診斷？
 (A)乾癬性關節炎 (Psoriatic arthritis, PsA) (B)骨性關節炎 (Osteoarthritis, OA)
 (C)類風濕性關節炎 (Rheumatoid arthritis, RA) (D)痛風性關節炎 (Gouty arthritis)
- A 20 上石膏後 24 小時內病人的護理評估結果，下列何者應做立即處置？
 (A)石膏表面有灼熱點(B)石膏肢體遠端有輕微水腫
 (C)石膏肢體內皮膚搔癢(D)石膏肢體有酸味
- C 21 有關美尼爾氏症候群的敘述，下列何者錯誤？
 (A)又稱為迷路水腫(B)好發於 40~60 歲成人
 (C)女性病人在月經後，症狀可能惡化(D)易發生在長期噪音工作環境者
- A 22 有關鼻咽癌病理學的敘述，下列何者錯誤？
 (A)曾感染 EB 病毒的人就會罹患鼻咽癌(B)鼻咽癌病人血清中 EB 病毒抗體效價高
 (C)第六對染色體有異常基因組者，罹病率較高(D)鼻咽癌為上皮性癌
- C 23 有關扁桃腺炎病人接受扁桃腺切除術之敘述，下列何者錯誤？
 (A)適用於反覆慢性扁桃腺感染病人(B)不適用於有血液惡性疾病的扁桃腺炎病人
 (C)術後病人經常有吞嚥動作是正常的(D)術後醫囑可以開始進食時，須先進冷食
- B 24 有關喉癌病人接受全喉切除術後之護理處置，下列何者錯誤？
 (A)維持呼吸道通暢為首要目標(B)協助採取側臥式
 (C)當病人坐起時需以手支托後頸(D)傷口癒合前須由鼻胃管補充營養
- B 25 一位 26 歲新婚女性，有計畫懷孕，近日因心臟不適，經醫師診斷二尖瓣狹窄，並建議更換心臟瓣膜，有關瓣膜選擇與抗凝劑使用之敘述，下列何者最適當？
 (A)宜選用機械性人工瓣膜，並需服用 warfarin(B)宜選用生物性人工瓣膜，不可服用 warfarin
 (C)宜選用機械性人工瓣膜，不可服用 warfarin(D)宜選用生物性人工瓣膜，並需服用 warfarin
- C 26 心臟衰竭病人使用 Dopamine 6 ug/kg/min，給予該劑量 Dopamine 之最主要目的為何？
 (A)增加腎臟血流量(B)促進周邊血管收縮(C)使心肌收縮力增加(D)降低腎絲球過濾率
- B 27 有關心臟復健 (Cardiac Rehabilitation, CR) 運動原則之敘述，下列何者錯誤？
 (A)運動前應先暖身 5~10 分鐘
 (B)為達到最大運動效果，可以摒住呼吸
 (C)用餐後不宜立刻運動
 (D)運動強度之最大心率以 (220-年齡) × 70~85% 為原則
- D 28 下列何項檢查無法評估心輸出量？
 (A)心臟超音波(B)肺動脈導管(C)心導管檢查(D)運動心電圖

- C 29 有關冠狀動脈疾病病人接受鉀-201 之檢查目的，下列何者正確？
(A)監測僧帽瓣及主動脈瓣的功能(B)觀察心室收縮及舒張的情形
(C)確定心肌受傷的部位與範圍(D)判定心臟電氣傳導的狀態
- C 30 有關二尖瓣閉鎖不全或逆流所產生之心雜音，在心動周期出現的時間，下列何者正確？
(A)舒張全期(B)舒張前期(C)收縮全期(D)收縮末期
- A 31 下列血脂肪之檢驗值何者不正常？
(A)低密度脂蛋白 170 mg/dL(B)高密度脂蛋白 60 mg/dL
(C)總膽固醇 150 mg/dL(D)低密度脂蛋白/高密度脂蛋白=1.5
- C 32 有關惡性腫瘤特徵的敘述，下列何者正確？①細胞通常分化不良 ②腫瘤通常有被膜包覆 ③生長速度通常很迅速 ④易轉移易復發
(A)①②③(B)①②④(C)①③④(D)②③④
- B 33 病人的皮膚黏膜蒼白、舌頭發炎呈紅色平滑狀，指甲萎縮、變薄呈湯匙狀，可能罹患下列何種貧血？
(A)葉酸缺乏性貧血(B)缺鐵性貧血(C)惡性貧血(D)再生不良性貧血
- B 34 有關癌症手術治療特性之敘述，下列何者正確？
(A)冷凍手術是一種診斷疾病分期的手術
(B)手術治療是切除原發癌或已轉移的固態實質腫瘤
(C)手術適用於細胞分化差、生長快速且局部的腫瘤
(D)雷射手術優點是切除腫瘤組織，但會增加手術出血的危險
- B 35 當癌症病人出現下列何種血液檢驗數據時，要考慮停止化學治療？①白血球 1,500/ μ L ②紅血球 500 萬/ μ L ③血小板 11 萬/ μ L ④絕對嗜中性球 1,000/ μ L
(A)①②(B)①④(C)②③(D)③④
- C 36 有關靜脈導管 Port-A 之敘述，下列何者正確？①放置 Port-A 人工血管，須採全身麻醉方式 ②Port-A 導管可由腋靜脈放置到鎖骨下靜脈 ③注射起泡性藥物時，應測試是否有回血 ④注射藥物時，使用一般空針 90 度插入，以免發生外滲
(A)①③(B)①④(C)②③(D)②④
- A 37 有關癌症病人血鈣之敘述，下列何者錯誤？
(A)癌細胞轉移到骨頭，會出現低血鈣的現象
(B)白蛋白數值低下時需矯正鈣質數值，以免低估了高血鈣的狀況
(C)高血鈣的治療是補充大量水分
(D)利尿劑可促進腎臟對鈣的排泄
- A 38 有關食道靜脈曲張藥物治療之敘述，下列何者錯誤？
(A) Furosemide(B) Propranolol(C) Sandostatin(D) Vasopressin
- D 39 有關癌症病人發生口腔炎之護理指導，下列何者錯誤？
(A)教導飯前使用 0.1% xylocaine 漱口，以減輕疼痛
(B)鼓勵飯後 30 分鐘內，以軟毛牙刷清潔口腔
(C)教導食用冷的流質食物，增加維生素攝取
(D)鼓勵自行購買漱口水清潔口腔
- C 40 下列何種皮膚疾病是由自體免疫系統所引起，會出現急性炎症反應但不具傳染性？
(A)鵝口瘡(B)帶狀疱疹(C)紅斑性狼瘡(D)疥瘡
- A 41 有關大面積重度燒傷初期（48 小時內），對於心臟血管系統造成的影響，下列何者錯誤？
(A)中心靜脈壓升高(B)心輸出量減少(C)全身性水腫(D)脈搏淺快
- C 42 有關足癬的敘述，下列何者錯誤？
(A)為黴菌感染(B)多因穿不透氣鞋襪而引起

- (C)急性期出現紅斑(D)可於趾間灑上滑石粉維持乾燥
- B 43 有關化學性灼傷的處置，下列何者錯誤？
 (A)立即去除身上的化學物質(B)可將化學藥劑的中和劑塗抹在皮膚接觸部位
 (C)以大量流動的水沖洗接觸部位至少 20 分鐘(D)眼睛灼傷時，須用生理食鹽水或清水沖洗
- C 44 有關過敏性休克之敘述，下列何者錯誤？
 (A)過敏反應發生後數分鐘內休克，可能會有死亡的危機
 (B)因接觸外來物質所引起，如藥物、花粉、灰塵等
 (C)由嗜酸性細胞釋出血管活性的介質，如組織胺、白三烯素
 (D)再次碰到相同過敏原，會產生大量抗體 IgE
- C 45 一位 30 歲女性主訴最近出現皮膚對光敏感、對稱性關節疼痛、口腔潰瘍，另補體 C3 及 C4 減少、抗核抗體 (ANA) 呈現陽性、紅血球沉降速率 (ESR) 明顯上升、血小板減少，下列何者為其最可能之診斷？
 (A)痛風性關節炎(B)後天免疫缺乏症候群
 (C)全身性紅斑性狼瘡(D)類風濕性關節炎
- D 46 有關治療類風濕性關節炎使用之藥物，下列何者不適當？
 (A)水楊酸藥物，如 aspirin(B)免疫抑制劑，如 methotrexate
 (C)糖皮質類固醇，如 prednisone(D)利尿劑，如 furosemide (Lasix)
- D 47 愛滋病人感染肺囊蟲肺炎之初期主要症狀，下列何者正確？
 (A)體重下降(B)皮疹(C)氣喘(D)乾咳
- B 48 有關肺栓塞病人之護理處置，下列敘述何者最正確？
 (A)教導病人應多食用青花椰菜、甘藍、菠菜等
 (B)教導病人坐姿時，應避免翹二郎腿或交叉雙腿
 (C)教導病人胸痛時，可服用 NTG 緩解疼痛
 (D)教導病人使用誘發性肺量計 (incentive spirometry)，增進肺部血流
- C 49 有關氣喘病人使用糖皮質類固醇吸入劑 (glucocorticoid inhaled medication) 之護理指導，下列何者正確？
 (A)將此藥含在口中 15 秒後再緩慢吸入(B)當急性發作時應立即使用此藥緩解
 (C)使用此藥物後應漱口(D)此藥不可突然停藥必須逐漸減量
- B 50 當肺炎病人出現呼吸道清除功能失效與分泌物增加，且無法進行有效性咳嗽。下列護理措施何者最能促進其清除痰液？
 (A)鼓勵病人採胸式呼吸(B)鼓勵病人增加飲水量
 (C)教導病人用噘嘴式呼吸(D)協助病人採半坐臥式
- A 51 有關慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的病人使用噘嘴式呼吸的目的，下列何者正確？
 (A)減少二氧化碳滯留在肺部(B)促進痰液排除
 (C)降低呼吸道的壓力(D)增加橫膈的肌肉力量
- C 52 外傷性肋骨骨折病人可能出現之徵候與症狀，下列何者正確？
 (A)慢且深的呼吸型態，且疼痛持續存在(B)快且深的呼吸型態，且吐氣時疼痛感加劇
 (C)較淺的呼吸型態，且吸氣時疼痛感加劇(D)喙嘆式的呼吸型態，且飯後疼痛感加劇
- D 53 有關急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 的處置，下列何者錯誤？
 (A)使用濃縮紅血球以維持正常血色素來增加攜氧能力
 (B)使用膠質溶液以減少微血管滲漏程度
 (C)使用升壓劑以改善心輸出量不足現象
 (D)使用陽壓呼吸器以降低功能性肺餘容積
- B 54 下列何者降低時，可作為阻塞性肺疾病的特徵？

- (A) DLCO (一氧化碳擴散容量) (B) FEV1/FVC
(C) FEV25~75% (D) RV
- D 55 病人肺部手術後出現呼吸速率加快、粉紅色泡沫狀痰液、持續性咳嗽、呼吸困難和囉音等表徵，最有可能的合併症是下列何者？
(A)肺炎(B)氣胸(C)肺栓塞(D)急性肺水腫
- B 56 蔡先生因急性腎衰竭而住院，正處於少尿期，下列何項護理指導正確？
(A)應採低熱量飲食(B)應限制高鈉高磷之食物
(C)應採高蛋白飲食(D)採高鉀飲食
- D 57 王先生因急性腎衰竭而急診入院，目前檢驗測得 arterial blood gas 為 pH：7.23，PaCO₂：32 mmHg，HCO₃⁻：17.5 mEq/L，PaO₂：82 mmHg，SaO₂：98%，此結果屬：
(A)呼吸性酸中毒(B)部分代償性呼吸性酸中毒
(C)代謝性酸中毒(D)部分代償性代謝性酸中毒
- B 58 承上題，下列何項處置可以最有效的改善王先生酸鹼不平衡之問題？
(A)立即給予紙袋罩住口鼻(B)注射 NaHCO₃
(C)注射 KCL(D)指導病人緩慢呼吸
- B 59 有關急性腎盂腎炎之敘述，下列何者正確？①常見於下泌尿道上行性感染 ②常見有肋骨脊柱角處疼痛 ③紅血球沉降速率 (ESR) 下降 ④急性期時應大量攝取液體
(A)①②③(B)①②④(C)①③④(D)②③④
- C 60 血液透析病人之液體攝取量的估計原則，下列何者最適當？
(A)前一日尿量加排汗量
(B)取決於下肢水腫程度
(C)兩次透析間體重增加以不超過其乾體重 5%
(D)兩次透析間體重增加必須控制在 2.0 公斤以內
- C 61 有關尿液檢查的敘述，下列何者錯誤？
(A)尿液分析是泌尿系統最簡便的例行檢查
(B)細菌培養若細菌數 > 10⁵ CFU/c.c. 表示泌尿道感染
(C)尿中肌酸酐和尿素氮是評估腎功能最佳指標
(D)清晨第一次尿液是尿液分析時最佳檢體
- D 62 張先生，68 歲，罹患糖尿病、高血壓，冠心病長期服用降血糖藥物、抗凝血劑及高血壓藥物，但血壓仍維持在 150~170/90~110 mmHg。近日因血尿、下肢水腫、發燒而入院，住院期間病人不宜接受下列何項診斷性檢查？
(A)靜脈腎盂攝影(B)酚紅試驗(C)肌酸酐廓清試驗(D)腎臟活體組織切片
- B 63 體液容積不足時之臨床表徵，下列何者正確？①口渴 ②體溫上升 ③尿比重下降 ④血比容積升高
(A)①③(B)①④(C)②③(D)②④
- B 64 甲狀腺機能亢進之臨床表徵，下列何者正確？①月經減少或停經 ②深肌腱反射減弱 ③指甲遠心端鬆脫 ④皮膚潮紅乾裂 ⑤脛前黏液水腫 ⑥指尖有刺麻感
(A)①②③(B)①③⑤(C)②④⑥(D)④⑤⑥
- A 65 長期使用類固醇製劑而導致愛迪生氏症 (Addison's disease) 之病人所呈現的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)皮膚與黏膜都會呈現褐色的色素沉著(B)漸進性的疲累、軟弱無力及體重減輕
(C)出現眩暈等姿位性低血壓以及脫水徵象(D)女性病人的腋毛與陰毛會出現減少情形
- C 66 有關高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 之敘述，下列何者正確？
(A)血糖上升，但高血糖較酮酸中毒輕微(B)血液 pH 值下降，呈現酮酸中毒

- (C)脫水嚴重，皮膚呈現潮紅、溫暖、乾燥(D)出現庫斯莫爾氏呼吸 (Kussmaul's breathing)
- A 67 有關糖尿病的藥物治療之敘述，下列何者正確？
- (A) metformin 為雙胍類 (biguanides) 抗血糖藥物，是治療糖尿病的首選藥物，肝腎功能異常者須慎用
- (B) glipizide 為磺醯脲類 (sulfonylureas) 抗血糖藥物，與 β 細胞磺醯脲類受體結合，刺激胰島素分泌，應於飯後服用
- (C) acarbose 為 α 糖苷酶抑制劑 (α -glucosidase inhibitors)，在小腸抑制澱粉分解，延緩葡萄糖吸收，應於飯前服用
- (D) exenatide 為類升糖素狀受體促效劑 (GLP-1 receptor agonists)，促進 GLP-1 的功能，刺激胰島素分泌與抑制升糖素分泌，採肌肉注射
- B 68 有關糖尿病酮酸中毒 (DKA) 的敘述，下列何者正確？
- (A)好發於女性老年人
- (B)多發生在第 1 型糖尿病病人胰島素治療中斷所致
- (C)多發生於第 2 型糖尿病病人身上，攝入過多食物所致
- (D)可能因為胰島素過多，攝入過多食物所致
- C 69 有關重症病人常發生高血糖狀態，下列何者為最可能之原因？
- (A)住院期間發現糖尿病(B)胰島素分泌不足
- (C)因應壓力產生糖質新生作用(D)運動量減少
- C 70 有關格雷氏病 (Grave's disease) 之敘述，下列何者正確？
- (A)血清脂質增加(B)好發於老年病人
- (C)甲狀腺素分泌過多所引起(D)主要徵象為副甲狀腺機能低下
- B 71 有關高血磷病人的護理指導，下列何者正確？①少吃堅果類與糙米飯 ②多補充維生素 D ③監測小便量與肝功能 ④注意下床活動安全 ⑤服用磷結合劑
- (A)①②③(B)①④⑤(C)②③④(D)③④⑤
- D 72 有關執行胸外心臟按壓的敘述，下列何者正確？
- (A)成人胸部按壓與通氣的比率为 15:1
- (B)胸外心臟按壓可達正常心搏出量的 60%
- (C)心臟按壓的速度需維持每分鐘 60~80 次
- (D)心臟按壓施救者掌根應置於病人兩乳頭連線與胸骨中線交接
- B 73 孕婦發生呼吸道梗塞的情況時，下列何種處置最適當？
- (A)腹戳法(B)胸戳法(C)刺激喉頭法(D)鼓勵孕婦多喝水
- B 74 有關監測敗血症病人液體療法之生理指標，下列何者最可能需調節輸液？
- (A)尿比重 ≤ 1.026 (B)收縮壓 < 80 mmHg(C)血液 pH 值 > 7.30 (D)中心靜脈壓 9 cmH₂O
- B 75 有關肉毒桿菌中毒的敘述，下列何者錯誤？
- (A)主因食入被臘腸桿菌產生的外毒素所污染的食物
- (B)除腸胃道症狀外，會有高燒
- (C)除腸胃道症狀外，會有視力模糊、複視等神經方面的症狀
- (D)對中毒病人除須注射抗毒素外，尚須施以洗胃灌腸以中和毒素或排出腸道毒素
- B 76 乳癌病人接受化學治療效果不佳，病人主訴：「我希望能活到女兒結婚有個依靠，我就可以放心離開，就讓我活到那時候吧！」請問病人是處於 Kubler-Ross 心理反應的那一階段？
- (A)否認期(B)磋商期(C)憤怒期(D)接受期
- D 77 乳癌病人手術後的病理報告：乳房惡性腫瘤為 3 公分，腋下有 2 顆淋巴結轉移。依癌症 TNM 分期，下列何者正確？
- (A) cT2N1M0(B) cT2N1Mx(C) pT2N1M0(D) pT2N1Mx

- D 78 有關過敏性休克的治療與護理指導，下列何者錯誤？
(A)治療的目標是緩解症狀(B)避免接觸過敏原或食用引起過敏的食物
(C)給予藥物或生物性製劑需先行皮膚試驗(D)減敏感療法之目的在增加 IgE 的濃度
- B 79 當支氣管擴張症病人出現下列何種狀況需盡速就醫？
(A)天氣炎熱痰液變得較黏稠(B)痰液明顯出現血絲或血塊
(C)進食大餐後呼吸變得較喘(D)痰液出現分層現象
- C 80 病人因腰椎椎間盤突出接受手術治療，術後依醫囑需穿硬背架 3 個月，下列敘述何者錯誤？
(A)指導病人可進行威廉氏運動加強下背部的肌肉力量
(B)指導病人拆線後便可沐浴，最好採淋浴
(C)應每兩小時將背架取下讓背部休息
(D)指導病人在床上穿好背架後再下床

高
點
醫
護

【版權所有，翻印必究】