

《產兒科護理學》

- D 1 護理師於婦女產後經由電話協助母親解決哺乳問題，屬於下列何種角色？
(A)照顧者(B)管理者 (C)研究者(D)諮詢者
- D 2 有關以家庭為中心的產科照護，下列何者錯誤？
(A)鼓勵配偶與新生兒手足參與生產過程(B)推廣親子同室增加新生兒與家庭成員互動
(C)鼓勵儘早出院與家人團聚(D)提供完全相同的產科常規照護以符合評鑑要求
- C 3 鄭女士因月經過期 8 週而至門診驗孕，她已有一對雙胞胎子女，曾於懷孕 8 週時胚胎因無胎心音而入院接受中止妊娠術，此次門診確認鄭女士已懷孕，因此其孕產史紀錄，下列何項正確？
(A) G4P2(B) G3P1SA1 (C) G3P1AA 1(D) G4P2AA1
- D 4 懷孕期間因雌性素 (estrogen) 所造成的生殖系統變化，下列何者錯誤？
(A)子宮頸黏液塞形成(B)陰道的血管增生、充血
(C)懷孕初期子宮頸變軟(D)懷孕後期子宮壁變薄
- C 5 一位孕前 BMI 為 23.1 kg/m² 的單胞胎孕婦，有關其孕期體重之護理指導，下列何者最適當？
(A)第一孕期如體重未增加，需要增加熱量攝取
(B)第二孕期，體重增加每個月應少於 1 公斤
(C)第三孕期，每個月體重增加可控制在 1.5~2.0 公斤之間
(D)整個孕期體重需增加控制在 7~10 公斤範圍內
- C 6 有關生產計畫書，下列敘述何者不適當？
(A)計畫書可包括待產、分娩和寶寶照護項目之選擇
(B)計畫書可包括生產流程與常規的說明
(C)讓婦女和醫護人員討論，兩者共同做決定
(D)鼓勵婦女表達其擔憂與需要
- A 7 懷孕 28 週婦女參加產前媽媽教室，練習母乳哺餵姿勢和嬰兒沐浴，此為下列何種母性認同行為之表現？
(A)角色扮演(B)模仿學習 (C)內射—接受(D)幻想—外射

- B 8 林女士 28 歲，孕前體重 56 公斤，目前懷孕 20 週，此次產檢體重為 64 公斤，血壓為 148/94 mmHg，尿蛋白 1+，下列護理指導何者最適當？
- (A)增加脂肪攝取(B)減少鹽分攝取 (C)減少蛋白質攝取(D)增加鈉攝取
- B 9 罹患妊娠糖尿病婦女，努力控制飲食，讓飯後血糖值在正常範圍，此為魯賓（Rubin）所提出何種母性任務行為？
- (A)學習貢獻自己(B)確保自己和胎兒安全
(C)使胎兒能被家人和重要他人所接受(D)與胎兒產生情感連結
- D 10 下列那個階段是胎兒體重快速增加的時期？
- (A)胚胎前期(B)第一孕期 (C)第二孕期(D)第三孕期
- C 11 有關產婦生產用力的描述，下列何者錯誤？
- (A)蹲姿生產是利用地心引力來幫助產婦向下用力
(B)產婦利用橫膈膜和腹部的肌肉來向下用力，其他肌肉放鬆，以免浪費力氣
(C)生產閉氣用力太長容易導致產婦肺靜脈回流上升，不利胎兒產出
(D)側躺姿勢有助於緩解向下用力的感覺，讓產婦較舒適
- C 12 有關待產婦之護理，下列敘述何者錯誤？
- (A)待產時如無破水，應鼓勵產婦下床走動，促進有效宮縮
(B)待產時應常變換姿勢，促進身體舒適與放鬆
(C)活動期的晚期應教導待產婦開始用力，以促進胎頭下降
(D)定期排空膀胱，促進胎頭下降
- B 13 初產婦廖女士進入產房待產，足月且孕期無其他併發症，目前每 5 分鐘子宮收縮一次，每次約收縮 30 秒，沒有破水，陰道有粉色分泌物，內診發現其子宮頸變薄 80%且已擴張 3 公分，station 0。廖女士詢問是否可以下床走動，下列回應何者較適切？
- (A)我沒法做決定，妳最好去問醫師
(B)只要妳覺得舒服，儘可下床活動
(C)應躺在床上，以免走路活動影響子宮收縮
(D)建議妳臥床休息，我們比較容易監測子宮收縮及胎心音
- B 14 承上題，廖女士的子宮收縮逐漸增強，陣痛越來越密且痛的持續時間較久，胎膜在此時破裂，護理師立即扶她上床，躺下後最優先執行的措施為：

- (A)通知醫師(B)聽胎心音
(C)計算宮縮的時間與頻率(D)測量血壓與脈搏
- D 15 下列何者為胎兒的先露部位和母親骨盆前後左右的關係？
(A)胎勢(B)胎姿 (C)胎產式(D)胎位
- B 16 有關胎心率的監測，下列敘述何者錯誤？
(A)正常足月兒的胎心率範圍介於 120~160 bpm
(B)胎兒受感染時，會導致胎心率過慢
(C)胎心率基準線指監測 10 分鐘以上兩次宮縮間的胎心率
(D)正常足月兒的胎心率變異性約在 6~10 bpm
- B 17 下列何者為子宮收縮頻率 (frequency) 的定義？
(A)子宮收縮時所持續增加的壓力(B)一次子宮收縮開始到下次宮縮開始之時間
(C)子宮收縮結束之後的平靜期(D)每次子宮收縮的開始到結束之時間
- D 18 產婦進入待產過程中，護理師協助陰道內診，無法獲得下列何項資料？
(A)子宮頸厚薄(B)子宮頸擴張 (C)胎頭下降程度(D)胎兒大小
- B 19 陰道生產的產後第二天，評估子宮底呈堅硬狀，位置在肚臍以下 2 公分，惡露呈紅色且小量，此時最適當的護理指導為何？
(A)教導按摩子宮底至鬆軟狀(B)解釋為子宮復舊正常現象
(C)給予誘尿(D)通知醫師處理
- A 20 有關產後痛 (after pain) 的護理，下列何者錯誤？
(A)通常在第三天後疼痛日益嚴重(B)臨床常以 10 分法進行疼痛評估
(C)鼓勵適度活動(D)教導深呼吸緩解
- D 21 王女士剖腹產後第一天，主訴腹部疼痛。評估美容膠覆蓋之傷口無滲液，腹部叩診鼓音，子宮收縮良好，惡露色紅量少無異味，下列何項護理措施最優先？
(A)因惡露量少，建議洗澡保持會陰清潔即可
(B)告知傷口美容膠不可弄濕，需每日清潔與更換
(C)鼓勵多喝水吃高纖維食物，以利腸蠕動
(D)協助翻身與下床，避免進食產氣食物

- B 22 陳先生初次當爸爸，從未參與新生兒照護，表示：「不要抱妹妹給我，她軟軟的，我不敢抱。」下列敘述何者最適當？
- (A)告知很多爸爸第一次會怕，之後習慣就好了
 - (B)鼓勵循序漸進，先撫觸嬰兒後再教導抱嬰兒技巧
 - (C)尊重陳先生害怕的感受，改由產婦全權照顧嬰兒
 - (D)嬰兒照護為父母雙方責任，衛教陳先生嬰兒照顧技巧
- B 23 劉女士剖腹產後因身體不適，且寶寶黃疸需住院照光治療而無法一同出院，她覺得自己不是好媽媽。下列何項措施對其親子依附關係的建立較不適當？
- (A)評估劉女士對自己身體復原與對寶寶照護的擔心
 - (B)為避免感染，新生兒住院期間不鼓勵媽媽探訪
 - (C)運用產婦的支持資源，讓產婦能將心力放在新生兒身上
 - (D)鼓勵產婦與新生兒有眼對眼及身體上的接觸
- A 24 有關產後婦女生理復舊變化之敘述，下列何者正確？
- (A)產後初期有利尿現象，可將身體組織囤積過多的液體排出體外
 - (B)生產過度用力或脫水，產後體溫會上升至 38°C ，持續約 2~3 天
 - (C)產後脈搏速率會增快至 100 次/分，於產後 3~7 天恢復正常
 - (D)產後初期腹肌鬆弛，腹壓減少，使得腸蠕動增快，而有輕瀉現象
- A 25 有關母乳之敘述，下列何者正確？
- (A)後奶 (hindmilk) 較白，富含脂肪，熱量較前奶高
 - (B)前奶 (foremilk) 清淡，富含酪蛋白
 - (C)嬰兒吸食前奶才能得到足夠的營養及水分
 - (D)母乳哺餵時，仍需補充水分給嬰兒
- B 26 有關產後生殖器官的復舊過程，下列何者正確？
- (A)每天以相同進展恢復(B)子宮體積縮小屬於退行性變化
 - (C)三種型態的惡露採循環的方式排出(D)大約持續 6 個月完成
- D 27 有關新生兒身體評估結果，下列何者異常？
- (A)出生時，鼻頭有粟粒疹(B)出生 1~3 天左右，身體表面出現毒性紅斑

- (C)頭圍 35 公分(D)舌頭上有凝乳塊狀的白色斑點
- B 28 有關足月新生兒身體成熟度評估，下列特徵何者錯誤？
- (A)皮膚乾裂，且幾乎看不見血管
 - (B)乳暈平坦無突起
 - (C)耳軟骨堅硬成形，用手彎凹後放開可立即反彈
 - (D)眼瞼張開
- D 29 有關神經系統反射的敘述，下列何者正確？①擁抱反射（moro reflex）是將新生兒突然改變姿勢後，四肢對稱性外展且伸直 ②尋乳反射（rooting reflex）是觸碰新生兒嘴角時出現舌頭伸出的現象，表示新生兒飢餓，應該餵食 ③巴賓斯基反射（Babinski reflex）是以手指自新生兒腳跟沿外側朝□趾方向刺激，新生兒腳趾會內縮 ④頸部強直反射（tonic neck reflex）是新生兒平躺時，將頭轉向一側，轉向的那一側手腳會伸展，對側會屈曲狀
- (A)①②(B)②③ (C)③④(D)①④
- D 30 下列何種胎產式之胎頭徑線最短，較能順利分娩？
- (A)面產式(B)額產式 (C)前頂產式(D)頭頂產式
- C 31 根據臺灣優生保健法施行細則規定，除醫療行為外，人工流產應於幾週內施行？
- (A) 12(B) 20 (C) 24(D) 28
- B 32 子癇前症之症狀，下列何者錯誤？
- (A)高血壓(B)痙攣 (C)蛋白尿(D)水腫
- B 33 有關懷孕期 TORCH 感染的項目，下列何者錯誤？
- (A)弓形蟲病(B)麻疹 (C)單純疱疹病毒(D)巨細胞病毒
- D 34 王女士接受試管嬰兒治療，今日抽血驗孕報告為未懷孕，王女士表示自己懷孕症狀明顯，一定是檢驗錯誤，下列護理措施何者最適當？
- (A)立即連絡施術醫師解釋檢驗報告
 - (B)解釋抽血報告最準確，請王女士再接再厲
 - (C)衛教懷孕症狀為妊娠的主觀經驗，請王女士要努力接受現實
 - (D)鼓勵王女士表達其疑問與擔憂，詢問是否需要協助聯絡配偶到院，與醫療團隊共同討論後續治療規畫
- B 35 下列何者為陰道產的產後出血定義？
- (A)產後 12 小時內，出血超過 500 c.c.(B)產後 24 小時內，出血超過 500 c.c.

- (C)產後 12 小時內，出血超過 250 c.c.(D)產後 24 小時內，出血超過 250 c.c.
- A 36 有關陰道瘻管，下列敘述何者正確？
- (A)最常見的原因為手術傷害(B)甲基藍試驗是以試紙測試
(C)治療方式以內科治療為主(D)病人身上經常有糞便味
- B 37 下列何者不屬於後天免疫缺乏症候群（AIDS）之伺機性感染？
- (A)口腔念珠菌感染(B)淋巴腺腫大
(C)肺囊蟲肺炎(D)囊球菌腦脊髓膜炎
- A 38 陳女士 G4P3，有急產之經驗，目前子宮頸開 7 公分，主訴一直有便意感，下列敘述何者錯誤？
- (A)請她先上廁所解便，減緩不適(B)聯絡醫師，並準備生產之環境
(C)陰道內診了解子宮頸口擴張情形(D)教導先不要用力，採吹蠟燭式呼吸法
- D 39 林女士 22 歲，因外陰部搔癢並有泡沫狀、黃綠色及有異味的陰道分泌物，內診時可見子宮頸上皮有草莓狀紅點，最有可能是下列何種病原感染？
- (A)砂眼披衣菌(B)白色念珠菌 (C)梅毒螺旋體(D)陰道鞭毛滴蟲
- A 40 有關毒性休克症候群之敘述，下列何者正確？
- (A)多發生於經期使用衛生棉條的女性(B)是受到黴漿菌感染所致
(C)臨床症狀少有發燒現象(D)臨床症狀為單一器官系統異常
- D 41 小畢 3 歲，因為經常出現咬手、打頭、撞牆行為而就醫，醫師診斷有自閉症，護理師指導父母有關自閉症的兒童照護，下列何者錯誤？
- (A)不要因為孩子診斷有自閉症，而心存罪惡感或愧疚
(B)公平的對待孩子，不必過度關注病童而忽略其他正常孩子的教養
(C)可嘗試帶著病童走入人群，讓其也能享有正常的社交活動
(D)對孩子單調固定的習慣給予改變，儘量每日安排不同活動，使生活多采多姿
- B 42 下列何者較不屬於兒童遭受虐待／疏忽的常見徵象？
- (A)身上有多處瘀傷痕跡(B)表現活潑好動行為
(C)身體髒污發出異味(D)寒冬常穿短袖上學
- A 43 臺灣發展遲緩早期療育實施服務的流程，主要負責協調整合與管理的窗口為何？

- (A)兒童早期療育通報轉介中心(B)發展遲緩兒童聯合評估中心
(C)各縣市政府衛生局(D)發展遲緩兒童早期療育中心
- D 44 有關預防嬰幼兒鉛中毒，下列可減少鉛的吸收之敘述，何者錯誤？
(A)進食前應協助嬰幼兒洗手(B)選擇不會掉漆的安全玩具
(C)避免攝入過多罐頭食物(D)多攝取富含脂肪酸的食物
- D 45 強強 4 歲，誤食退燒藥，至急診求治，診斷為乙醯氨基酚 (acetaminophen) 中毒，下列敘述何者正確？
(A)誤食後應立即給予 naloxone
(B)誤食二小時內應避免洗胃及催吐
(C)誤食三天後開始使用活性炭吸附劑
(D)誤食後常用的解毒劑為 N-acetylcysteine (mycomyst)
- B 46 有關嬰幼兒呼吸系統的解剖生理特徵，下列何者正確？
(A)嬰幼兒舌頭在口腔所占的比例比成人小，鼻腔過濾效果較佳
(B)嬰幼兒的咽喉較狹窄，會厭軟骨較大，比成人較易造成吸入性肺炎
(C)嬰幼兒採腹式橫膈膜呼吸，乃因其肋骨位置較成人垂直，胸肋骨支持穩定性較小
(D)嬰幼兒耳咽管較短、窄，呈垂直，致病菌易進入中耳，易發生感染
- B 47 小宏足月生產，出生體重 3 公斤，目前 3 歲，下列敘述何者較不符合此年齡層的生長發展？
(A)目前體重 13 公斤(B)呼吸以胸壁肌肉為主
(C)乳齒幾乎全部長出(D)大便訓練完成
- A 48 婷婷 3 歲，喜歡吸吮大拇指，但是擔心被母親發現，所以總是以另一手遮掩，婷婷覺得自己隱藏得很好，別人不會發現。她的行為是下列何種認知思考特性的反應？
(A)自我為中心(B)去集中作用 (C)保留概念(D)可逆性
- A 49 有關生命末期兒童疼痛評估和照護，下列敘述何者最不適當？
(A)病童喊痛時需給予 meperidine 進行止痛(B)利用 QUESTT 進行兒童疼痛評估的蒐集
(C)儘量避免和減少不必要的侵入性治療(D)教導家屬利用非藥物方式轉移注意力
- C 50 當護理師為病童點眼藥水時，下列敘述何者較不適宜？
(A)使病童平躺或半坐臥，頭部後仰(B)將病童下眼瞼向下向外拉出成囊狀

- (C)將眼藥水輕輕滴於病童眼球處(D)滴藥後，以手指按壓內眥淚點約 1 分鐘
- A 51 小萱出生第 3 天，左手手臂活動受限，擁抱反射不對稱，兩肩不等高，局部觸痛及腫脹。依此觀察，小萱可能有下列何種問題？
- (A)鎖骨骨折(B)橈骨骨折 (C)尺骨骨折(D)肱骨骨折
- B 52 下列何者不屬於新生兒篩檢的項目？
- (A)葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酵素 (G-6-PD) 缺乏症(B)唐氏症
(C)苯酮尿症(D)甲基丙二酸血症 (MMA)
- A 53 王小弟經由母親垂直感染後天免疫缺乏症候群 (AIDS)，下列敘述何者正確？
- (A)卡氏肺囊蟲肺炎為最常見的死因(B)王小弟的大小便會傳染病毒
(C)王小弟不可以接種 B 型肝炎疫苗(D)王小弟可以接種卡介苗
- B 54 小莉被診斷為血小板無力症 (thrombasthenia)，此次入院進行首次輸血小板治療，她表示現在最害怕受到懲罰，她的發展最可能屬於下列何階段？
- (A)學步期(B)學齡前期 (C)學齡期(D)青少年期
- B 55 小琪 2 歲，為急性骨髓性白血病 (AML) 末期。有關瀕死病童的照顧，下列敘述何者較不適當？
- (A)開誠溝通，表露關懷(B)害怕失去病童，會積極治療
(C)症狀控制與維持舒適(D)尊重家庭的宗教信仰與信念
- D 56 有關早產兒腸胃系統功能，下列敘述何者不適當？
- (A)早產兒胃容量小且胃腸蠕動弱(B)心跳及呼吸速率快，新陳代謝快
(C)對脂肪消化能力有限(D)消化乳糖能力至妊娠 32 週以後才成熟
- C 57 有關麻疹 (measles) 的症狀敘述，下列敘述何者正確？
- (A)具高傳染性，必須採腸胃道隔離
(B)疹子最早會出現在軀幹，再擴散至頸部、臉部和四肢
(C)紅疹出現前 3~5 天至出現紅疹後 4 天，為傳染期
(D)發燒時使用 aspirin 退燒
- B 58 有關嬰兒玫瑰疹的敘述，下列何者正確？
- (A)好發的年齡為 2~5 歲(B)當高燒消退後，開始出現疹子

- (C)最常見的合併症為中耳炎(D)病原大多是第二型疱疹病毒所引起
- A 59 林小妹 4 歲，常用手抓屁股，疑有蟯蟲感染，將進行透明膠帶試驗（scotch tape test），最合適的蟲卵採集時間為何？
- (A)清晨尚未起床時(B)中午進餐後 (C)傍晚進餐前(D)睡覺前
- B 60 小花 6 個月，疑似罹患呼吸道融合病毒，有關採檢相關的敘述，下列何者最適當？
- (A)糞便的病毒培養(B)鼻內分泌物及血液免疫分析
(C)鼻內分泌物的細菌培養(D)血液厭氧培養
- B 61 有關病童使用氧氣帳（O₂ tent）之照護，下列何者較適當？
- (A)應注意維持帳內高氧、低濕度及低溫的環境
(B)儘量以集中護理的方式，維持帳內的氧氣濃度
(C)為避免病童有隔離感，應鼓勵照顧者於帳內陪伴
(D)讓病童將其心愛的電動玩具帶入，以免病童無聊
- C 62 林小妹 6 歲，因反覆性氣喘發作入院，現病情已漸趨穩定欲出院，有關出院的居家照顧，下列敘述何者正確？
- (A)家中儘量採用布織的窗簾，以降低過敏
(B)床單枕頭以 30~40°C 的熱水每個月清洗一次為宜
(C)兒童運動種類應以可控制自己呼吸狀況的有氧運動為主，如慢跑、游泳、騎腳踏車
(D)由於塵蟎易存在木製品或皮革製品上，睡覺時以提供彈簧床或榻榻米為宜
- C 63 有關罹患心臟病嬰兒的護理照護，下列何者最適當？
- (A)少量多餐，奶瓶餵食時間不要少於 30 分鐘，避免吸得太快太急
(B)心衰竭的嬰兒以低鈉的配方奶取代母乳，減少鈉的攝取量
(C)必要時使用鼻（口）胃管餵食，減少心臟負荷
(D)補充鈣質可增加血紅素的載氧量
- A 64 小東 8 個月，診斷為法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot），哭鬧厲害全身發紺，此時護理師給予氧氣，並將小東擺為膝胸臥式之目的為何？
- (A)減少回流至心臟之血量(B)減少全身血管阻力
(C)減少右心室流向肺動脈之血量(D)減少身體耗氧量

B 65 有關胎血循環的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 臍靜脈的血液經由靜脈導管流向下腔靜脈
- (B) 經過卵圓孔的血液是由左心房流向右心房
- (C) 右心室的血液多數由肺動脈幹直接經動脈導管流入主動脈
- (D) 臍靜脈的血氧濃度高於臍動脈

C 66 有關體染色體隱性遺傳之疾病，下列何者錯誤？

- (A) 原發性再生不良性貧血 (Fanconi's anemia)
- (B) 海洋性貧血
- (C) G-6-PD 缺乏症
- (D) 鎌狀細胞貧血

B 67 小漢 8 歲，罹患血友病 (hemophilia)，下列護理措施何者最適當？

- (A) 關節出血時，加壓並給予熱敷，減輕不適
- (B) 鼓勵病童從事適度的活動，以強化其關節肌肉
- (C) 刷牙時應選用硬毛刷
- (D) 持續疼痛不止，可依醫囑給予止痛藥，如阿斯匹靈 (aspirin)

C 68 9 歲的小君，診斷白血病 (leukemia)，目前接受化學治療，其血液檢驗數值嗜中性白血球計數為 $800/\text{mm}^3$ ，有關護理措施，下列敘述何者不適當？

- (A) 接觸病童前後都要洗手
- (B) 禁止施打活性疫苗
- (C) 發燒時使用肛門塞劑來退燒
- (D) 飲食遵守低微生物餐的原則

B 69 小明 3 歲，罹患急性淋巴性白血病，有關接受誘導期化學治療的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 相較於 6 個月或是 12 歲罹病的病童，小明有較佳的預後
- (B) allopurinol 是用來預防腫瘤溶血症候群的藥物
- (C) 中樞神經系統和睪丸是急性淋巴性白血病最常復發的地方
- (D) MTX、Ara-C、hydrocortisone 用來預防中樞神經系統復發

- C 70 小美 5 歲，出現發燒、臉色蒼白、虛弱、肚子痛，經醫師確診為神經母細胞瘤第三期，下列敘述何者最不適當？
- (A)小美腫瘤已經出現轉移，因此無法完全切除腫瘤
 - (B)小美的症狀會依腫瘤位置而出現不同的疾病進展
 - (C)可以推測小美已經轉移至骨髓、骨骼、肝臟等處
 - (D)如果腫瘤轉移至眼睛，小美會有上眼瞼下垂症狀
- B 71 癌症病童接受治療期間，有關疫苗接種之敘述，下列何者最不適當？
- (A)可以接種流行性感冒疫苗(B)可以口服小兒沙賓疫苗
 - (C)不可以接觸水痘病人(D)不可以接觸麻疹病人
- A 72 小曄 3 個月大，因為唇裂 (cleft lip) 而入院，經醫師進行唇裂修補術後返回病室，有關手術後護理，下列敘述何者錯誤？
- (A)協助採取俯臥姿勢，以促進分泌物流出，預防呼吸道阻塞
 - (B)須適當約束手肘，避免病童碰觸傷口影響癒合
 - (C)儘量避免嬰兒吸吮，安撫奶嘴暫時勿使用
 - (D)餵完奶後，應給予清水清洗口腔以預防感染
- C 73 王小弟腹瀉三天，每天高達 10 次，體重從 10 公斤降至 9.2 公斤，尿量也減少。請問王小弟的脫水程度為何？
- (A)沒脫水(B)輕度脫水 (C)中度脫水(D)重度脫水
- B 74 有關腸套疊 (intussusception) 的臨床表徵，下列敘述何者正確？
- (A)常出現咳嗽、梗塞、發紺等症狀(B)解草莓果醬般大便
 - (C)腹部的左下象限內會觸摸到香腸狀腫塊(D)解出暗茶色尿液
- C 75 兒童健康手冊有嬰兒大便卡，請家長比對嬰兒大便的顏色，可早期發現膽道閉鎖兒，主要目的為何？
- (A)預防核黃疸，減少神經損傷(B)早期給予特殊奶粉，減少代謝異常
 - (C)儘早進行手術，減少肝臟損傷(D)儘快給予排膽劑，以利膽汁排出
- B 76 陳小弟 11 歲，因闌尾炎進行盲腸切除術。有關手術後護理措施，下列敘述何者正確？
- (A)疼痛時少用止痛劑，因易降低腸蠕動，可予腹部熱敷，減輕疼痛
 - (B)定時監測傷口有無紅、腫、熱、痛等發炎現象

- (C)鼓勵病童臥床休息，減少下床，以預防傷口縫線滲血，導致影響傷口癒合
- (D)術後如有引流管留置，應採平躺姿勢，以利傷口引流

A 77 有關提供癲癇病童長期服用抗癲癇藥物的護理措施，下列何者錯誤？

- (A)需與牛奶一起服用，避免吸收不良
- (B)定時回診監測血中藥物濃度
- (C)即使發作頻率降低，也不可自行停藥
- (D)使用 phenytoin (Dilantin) 常見副作用是牙齦增生

B 78 有關發展性髖關節發育不良病童，使用帕米利克背帶 (Pavlik harness) 的護理措施，下列敘述何者不適當？

- (A)使用目的是維持髖關節屈曲及外展
- (B) 2 歲以上的病童，只需穿戴此背帶直到骨盆發育穩定就會痊癒
- (C)建議父母在背帶正確位置做記號，以方便調整回正確位置
- (D)維持背帶下皮膚的清潔及完整性

D 79 當懷疑個案出現腦膜炎時，醫師常會執行柯林氏徵象 (Kernig's sign) 之身體評估，此評估正確做法為何？

- (A)以反射錘柄由足跟沿上經足外緣至大趾，出現腳趾呈扇形張開
- (B)讓兒童平躺，將其頭向上抬時，兒童會不自主的彎曲膝蓋及髖部
- (C)讓兒童以兩腳之腳尖踮起走路，測試走路穩定狀態
- (D)使平躺將小腿托高，使髖及膝關節屈曲成直角，再伸展小腿會產生阻力或疼痛

B 80 小英 6 歲，因扁平足 (flat foot) 就診，有關護理指導之敘述，下列何者正確？

- (A)建議墊腳尖及跳躍，以加強足背肌腱訓練
- (B)使用矯正鞋墊配合矯正鞋，誘導足弓發育
- (C)使用功能性鞋墊，以預防足弓繼續塌陷
- (D)建議考慮以滑膜切除術，預防阿基氏腱的短縮